



INDICACIONES CLÍNICAS

GUIA DE USOS EN MEDICINA VETERINARIA

CBD Broad Spectrum de grado farmacéutico, actúa como coadyuvante dentro del manejo integral del paciente con dolor agudo y crónico en diversas patologías.

1

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

- Epilepsia idiopática
- Síndrome vestibular
- Mielopatía degenerativa
- Hidrocefalia
- Síndrome de Wobbler
- Traumatismo craneoencefálico
- Neoplasias intracraneales
- Convulsiones
- Coadyuvante en signos clínicos de distemper canino

2

ANSIEDAD Y ESTRÉS

- Ansiedad por separación
- Trastorno obsesivo-compulsivo / Estereotipias
- Fobia a ruidos fuertes (tormentas, pirotecnia)
- Dermatitis por acicalamiento
- Cistitis idiopática felina (CIF)
- Síndrome de hiperestesia felina
- Agresividad por miedo o frustración
- Anorexia inducida por estrés
- Síndrome de pandora

3

MUSCULOESQUELÉTICAS

- Displasia de cadera
- Displasia de codo
- Rotura del ligamento cruzado anterior (LCA)
- Luxación patelar
- Osteocondritis disecante (OCD)
- Fracturas óseas y fisuras
- Manejo del dolor post quirúrgico

4

MANEJO DE APETITO Y DESGASTE

- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Lipidiosis hepática felina
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII / IBD)
- Neoplasias malignas avanzadas (caquexia tumoral)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Megaesófago
- Diabetes mellitus
- Hipertiroidismo felino

5

DOLOR E INFLAMACIÓN

- Osteoartritis / Enfermedad articular degenerativa (EAD)
- Enfermedad del disco intervertebral (EDIV / IVDD)
- Pancreatitis aguda o crónica
- Otitis externa y media
- Gingivoestomatitis crónica felina
- Espondilosis deformante
- Cistitis hemorrágica
- Dolor posoperatorio por cirugías mayores
- Geriatria

APOYO COADYUVANTE EN:

DOLOR E INFLAMACIÓN

Apoyo en el manejo multimodal del dolor e inflamación en procesos agudos y crónicos como osteoartritis y EAD.

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Apoyo en el manejo integral de pacientes con trastornos neurológicos, según criterio médico veterinario.

ANSIEDAD Y ESTRÉS

Apoyo en situaciones asociadas a ansiedad, estrés y alteraciones conductuales.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

INICIO: 0,3 mg/kg

1 gota ≈ 1,5 mg de Lopacann-Dol

Iniciar y titular progresivamente según respuesta clínica y tolerancia, bajo supervisión del médico veterinario.